



बिहार माध्यमिक शिक्षक

विषय : गणित

बिहार लोक सेवा आयोग

भाग - 4



बिहार माध्यमिक शिक्षक

विषय : गणित

भाग - 4

1.	Abstract Algebra	1
	• Group Theory	1
	• Subgroup	31
	• Complex of group	42
	• Cosets	47
	• Centre of group	54
	• Homomorphism	55
	• Isomorphism	57
2.	Real Analysis	69
3.	Complex Analysis	96
	• Limit, continuity and differentiability of complex function	96
	• Analytic function	99
	• Cauchy-Riemann equation	100
	• Harmonic function	106
	• Conformal mapping	113
4.	Calculus	128

Abstract Algebra

Group Theory

द्विआधारी संक्रियाओं के Ex:-

Ex- ① संक्रिया '+' समुच्चय \mathbb{N} में एक द्विआधारी संक्रिया है।
($a+b \in \mathbb{N}$)

② संक्रिया '+' समुच्चय \mathbb{Z} में " ———

③ संक्रिया 'x' ———, \mathbb{Z} — " ———

④ संक्रिया '-' समुच्चय \mathbb{Z} — " ———

⑤ संक्रिया '-', समुच्चय \mathbb{N} में द्विआधारी नहीं है।

⑥ संक्रिया '+' & 'x' समुच्चय \mathbb{Q} & \mathbb{R} में व \mathbb{C} में द्विआधारी संक्रिया है।

⑦ संक्रिया \div समुच्चय \mathbb{Q} , \mathbb{R} , \mathbb{C} में द्विआधारी संक्रियाएँ हैं।

⑧ समान कोटि के $m \times n$ के समुच्चय में $X = \{A: A = (a_{ij})\}$

मेंट्रिक्स योग की संक्रिया एक द्विआधारी संक्रिया है। $a_{ij} \in \mathbb{Q}$

⑨ समान कोटि के वर्ग मेंट्रिक्सों के समुच्चय

$M = \{A: A = (a_{ij})_{n \times n}, a_{ij} \in \mathbb{R}\}$ में मेंट्रिक्स योग & मेंट्रिक्स गुणन दोनों द्विआधारी संक्रियाएँ हैं।

⑩ समुच्चयों से समुच्चय U में संक्रियाएँ \cup & \cap दोनों द्विआधारी संक्रियाएँ हैं।

$$\because A \cup B \in U \quad \& \quad A \cap B \in U \quad \forall A, B \in U$$

★ द्विआधारी संक्रियाओं की सं. \Rightarrow

यदि समुच्चय A में n अवयव हों, तब $\& \forall A$ पर परिभाषित द्विआधारी संक्रियाओं की सं. $\Rightarrow n^2$ होगी।

$$\because n(A) = n$$

$$\therefore A(A \times A) = n \cdot n = n^2$$

$A \times A$ से A पर परिभाषित फलनों की सं. $= n^2$ होगी।

Ex:- 1) Set $A = \{a, b, c\}$ पर परिभाषित द्वि-आधारी संक्रियाओं की सं. = 3^9 होगी।

ग्रुपओपरेट	संवृत	साहचर्य	वत्समक	प्रतिलोम	क्रमविनिमय
ग्रुपओपरेट	✓	-	-	-	-
लूप	✓	-	✓	✗	-
समीग्रुप	✓	✓	-	-	-
मोनोओपरेट	✓	✓	✓	-	-
ग्रुप	✓	✓	✓	✓	-
क्रमविनिमय					
आबेली ग्रुप	✓	✓	✓	✓	✓

समीग्रुप के उदा. ⇒

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| ① $(\mathbb{N}, +)$ | ⑧ (\mathbb{R}, \times) |
| ② (\mathbb{N}, \times) | ⑨ $(\mathbb{C}, +)$ |
| ③ $(\mathbb{Z}, +)$ | ⑩ (\mathbb{C}, \times) |
| ④ (\mathbb{Z}, \times) | ⑪ (\mathbb{C}, \cup) |
| ⑤ $(\mathbb{Q}, +)$ | ⑫ (\mathbb{C}, \cap) |
| ⑥ (\mathbb{Q}, \times) | |
| ⑦ $(\mathbb{R}, +)$ | |

ग्रुप के उदा. ⇒

① $(\mathbb{Z}, +)$ ⇒

संवृत ⇒ $a + b \in \mathbb{Z} \quad \forall a, b \in \mathbb{Z}$

$\mathbb{Z}, +$ के लिए संवृत है।

साहचर्य ⇒ $(a+b)+c = a+(b+c), \quad \forall a, b, c \in \mathbb{Z}$

वत्समक ⇒ $\because 0 \in \mathbb{Z} \quad \& \quad a+0 = 0+a = a, \quad \forall a \in \mathbb{Z}$

प्रतिलोम ⇒ $\because a \in \mathbb{Z} \quad \therefore -a \in \mathbb{Z} \Rightarrow a+(-a) = 0 = (-a)+a$

$\therefore (\mathbb{Z}, +)$ group है।

कमविनिमेय $\Rightarrow a+b = b+a \quad \forall a, b \in \mathbb{Z}$

अतः $(\mathbb{Z}, +)$ एक आवेली group है।

(2) $(\mathbb{Q}, +)$

(8) $(M, +)$

(3) $(\mathbb{R}, +)$

हैरे $m, m \times n$ जोड़े के मैट्रिक्सों का set है। जो सामान्य संख्याओं पर परिभाषित है।

(4) $(\mathbb{C}, +)$

(5) (\mathbb{Q}, \times)

(6) (\mathbb{R}, \times)

(7) (\mathbb{C}, \times)

परिमित group \Rightarrow

(9) $G_0 = (\mathbb{Z}_0, +)$

(10) $G_1 = (\mathbb{Z}_2, \times)$

(11) $G_2 = (\mathbb{Z}_3, \times)$

(12) $G_3 = (\mathbb{Z}_4, \times)$

(13) $G_4 = (\mathbb{Z}_5, \times)$

(14) $G_5 = (\mathbb{Z}_6, \times)$

(15) $G_6 = (\mathbb{Z}_7, \times)$

X	1	-1
1	1	-1
-1	-1	1

X	1	ω	ω^2
1	1	ω	ω^2
ω	ω	ω^2	1
ω^2	ω^2	1	ω

X	1	-1	i	-i
1	1	-1	i	-i
-1	-1	1	-i	i
i	i	-i	1	-1
-i	-i	i	-1	1

\rightarrow

$+5$	0	1	2	3	4
0	0	1	2	3	4
1	1	2	3	4	5
2	2	3	4	5	1
3	3	4	5	1	2
4	4	5	1	2	3

X_5	1	2	3	4
1	1	2	3	4
2	2	4	1	3
3	3	1	4	2
4	4	3	2	3

Q.77)

$$a * b = a + b - ab$$

given $G = \mathbb{R} - \{1\}$

$$(G, *) ; a * b = a + b - ab$$

$(G, *)$ में तत्समक अवयव

निरीक्षण द्वारा कौन्य होगा।

सत्यापन- $a * 0 = a + 0 - a \cdot 0$ $\&$ $0 * a = 0 + a - 0 \cdot a$
 $a * 0 = a$ $= a$

$$[a * 0 = a = 0 * a] \quad \forall 0 \in G$$

$\therefore G$ में तत्समक अवयव 0 है।

Detailed method-

Let तत्समक अवयव e है।

$$\therefore a * e = a$$

$$\Rightarrow a + e - a \cdot e = a$$

$$\Rightarrow e(1 - a) = 0$$

$$\Rightarrow e = 0 \quad (a \neq 1)$$

\therefore तत्समक अवयव $= 0$ है।

Q.85) $G = \left\{ \frac{1+2m}{1+2n} ; m, n \in \mathbb{Z} \right\}$ गुणन संक्रिया के लिए समूह है।

\therefore गुणन के लिए तत्समक अवयव $= 1$

$$\therefore m = n = 0 \text{ पर}$$

$$\Rightarrow \frac{1+2 \cdot 0}{1+2 \cdot 0} = 1$$

$$\frac{1+2m}{1+2n} \text{ का प्रतिलोम} = \frac{1+2n}{1+2m}$$

Q.88)

Let Identity element $\Rightarrow e$ है।

Then $a * e = a$

$$a + e + 1 = a$$

$$\boxed{e = -1}$$

Q.97) Let $G = \left\{ \begin{bmatrix} a & a \\ a & a \end{bmatrix}, a \neq 0, a \in \mathbb{R} \right\}$

मैट्रिक्स गुणन के लिए एक समूह है।

निरीक्षण द्वारा - Let $e = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$, $A = \begin{bmatrix} a & a \\ a & a \end{bmatrix} \in G$

है $A \cdot e = A = e \cdot A \quad \forall A \in G$

$\therefore G$ में Identity element $\Rightarrow \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ है।

विस्तृत विधि -

Let group G में Identity element

$$E = \begin{bmatrix} e & e \\ e & e \end{bmatrix} \text{ है।}$$

$$\therefore AE = A$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} a & a \\ a & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e & e \\ e & e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & a \\ a & a \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow ae + ae = a \Rightarrow 2ae = a$$

$$e = \frac{1}{2}$$

$$\therefore E = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \text{ } G \text{ में तत्समक अवयव है।}$$

Q.106)

Similarly.

Q.98)

given let $G = \{ \pm 1, A, B, C \}$

A का व्यतिक्रम $\Rightarrow \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ का व्यतिक्रम

$$A^{-1} \Rightarrow \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^T$$

$$\Rightarrow \frac{1}{-1} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} \Rightarrow \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Q.99)

$a \times b = a + b + 1$ का तत्समक अव.

निरीक्षण द्वारा $\Rightarrow -1$

सत्यापन

$$a * (-1) = a + (-1) + 1 = a$$

$$\& (-1) * (b) = (-1) + b + 1 = b$$

$$\therefore a * (-1) = a = (-1) * a \quad \forall a \in \mathbb{Z}$$

IInd method

Let e ही संक्रिया के लिए तत्समक अवयव है:

$$\therefore a \cdot e = a$$

$$\Rightarrow a + e + 1 = a$$

$$\Rightarrow e + 1 = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{e = -1}$$

ग्रुप के उदाहरण \Rightarrow

① यदि $Z_n = \{0, 1, 2, 3, \dots, (n-1)\}$ प्रथम n अक्षणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय संक्रिया $+$ के लिए एक ग्रुप होता है।

Ex: \Rightarrow

$(Z_2, +_2)$	$Z_2 = \{0, 1\}$
$(Z_3, +_3)$	$Z_3 = \{0, 1, 2\}$
$(Z_4, +_4)$	$Z_4 = \{0, 1, 2, 3\}$

② Set $Z_p = \{1, 2, 3, \dots, (p-1)\}$ प्रथम $(p-1)$ घन पूर्णांकों का Set है।

here $p =$ अभाज्य सं. / संक्रिया \times_p के लिए एक ग्रुप होता है।

$$G_1 = \{1, 2, 3, 4; \times_5\}$$

$$G_2 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6; \times_7\}$$

* ग्रुप की कोटि \Rightarrow $G_0 = \{1, 0\}$, $G_1 = \{1, \omega, \omega^2; \times\}$

$$G_2 = \{1, -1, i, X\}$$

$$G_3 = \{1, -1, i, -i, X\}$$

$$G_4 = \{0, 1, 2, 3, 4; \times_5\}$$

here

$o(G_0) = 1$	$o(G_2) = 4$
$o(G_1) = 2$	$o(G_4) = 5$
$o(G_3) = 3$	

$+_5$	0	1	2	3	4
0	0	1	2	3	4
1	1	2	3	4	0
2	2	3	4	0	1
3	3	4	0	1	2
4	4	0	1	2	3

हल: here-
 0 का प्रतिबिम्ब = 0
 1 " " = 4
 2 " " = 3
 3 " " = 2
 4 " " = 1

\times_5	1	2	3	4
1	1	2	3	4
2	2	4	1	3
3	3	1	4	2
4	4	3	2	1

here-
 1 का प्रतिबिम्ब = 1
 2 " " = 3
 3 " " = 2
 4 " " = 4

Q.18) $\{z_6 + (\text{mod } 6)\}$ में $2 +_6 4^{-1} +_6 3^{-1}$ का मान = ?

$$z_6 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$2 +_6 4^{-1} +_6 3^{-1}$$

$$\Rightarrow 2 +_6 (2 +_6 3)$$

$$\Rightarrow 2 +_6 5 = 1$$

Q.5)

property-5 Page-6)

proof- $\because a \in G \Rightarrow a^{-1} \in G$

$\because a^{-1} \in G \nexists, b \in G \Rightarrow a^{-1}b \in G$

Now समी. $a \neq b$ में $x = a^{-1}b$ put \rightarrow

$$L.H.S. = ax$$

$$= a(a^{-1}b) = (aa^{-1})b = eb$$

$$= b = R.H.S.$$

द्वितीय प्रमेय के लिए

Now समी. $a \neq b$ के दो हल यदि संभव हैं x_1 & x_2 हैं।

$$\therefore ax_1 = b \text{ \& } ax_2 = b$$

$$\Rightarrow a x_1 = b x_2$$

$$\Rightarrow x_1 = x_2$$

अर्थात् दोनों हल समान हैं।

∴ समी. $a x = b$ का एक हल $a^{-1} b \in G$ है।

Ex. 13) by option -

$$(2) G = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix} ; a, b \in \mathbb{R}, a \neq 0 \right\}$$

let संवृत नियम

$$A_1 = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ -b_1 & a_1 \end{bmatrix}, A_2 = \begin{bmatrix} a_2 & b_2 \\ -b_2 & a_2 \end{bmatrix} \quad a_1 \neq 0, a_2 \neq 0$$

$$\begin{aligned} \text{Now } A_1 A_2 &= \begin{bmatrix} a_1 a_2 & b_1 a_2 \\ -b_1 a_2 & a_1 a_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_2 & b_2 \\ -b_2 & a_2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} a_1 a_2 + b_1 b_2 & a_1 b_2 + b_1 a_2 \\ -b_1 a_2 - a_1 b_2 & -b_1 b_2 + a_1 a_2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} c & d \\ -d & c \end{bmatrix} \in G \end{aligned}$$

$$I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{a^2 + b^2} \begin{vmatrix} a & -b \\ -b & a \end{vmatrix} \in G$$

अतः ये एक group है।

Similarly by option (1) $S \cup \emptyset = \text{group}$

page-7

(1) (G, \cdot) के प्रत्येक अवयव के लिए $a^2 = e$ है।

$$\therefore a^2 = e \Rightarrow a \cdot a = e \Rightarrow a^{-1} = a$$

$$\text{let } a \in G, b \in G \Rightarrow a^{-1} = a \Rightarrow b^{-1} = b$$

$$\therefore a \in G, b \in G \Rightarrow (a, b) \in G$$

$$\Rightarrow (a, b) = (ab)^{-1}$$

$$\Rightarrow (a, b) = b^{-1} a^{-1} \Rightarrow ab = ba$$

∴ G क्रमविनिमेय है।

Ex:- ① $G = \{1, -1, i, -i\}$ एक आबेली ग्रुप है।
but इसका प्रत्येक अवयव a , स्वयं का प्रतिलाम के equal नहीं है।

① ऐसा आबेली ग्रुप जिसके प्रत्येक अवयव, तत्समक अवयव के अतिरिक्त, की कोटि 2 है।

(i) क्लाइन 4 ग्रुप है।

$$G = \{e, a, b, c\}$$

	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

$e^{-1} = e$
$a^{-1} = a, b^{-1} = b$
$c^{-1} = c$
$a \cdot b = c$
$b \cdot c = a$
$c \cdot a = b$



(ii) $G = \{f_1, f_2, f_3, f_4, 0\}$

here $f_1(x) = x, f_2(x) = -x, f_3(x) = \frac{1}{x}, f_4(x) = \frac{1}{-x}$

Set G , संयुक्त फलन संक्रिया के लिए ग्रुप है।
इसके प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलाम है। इसकी संक्रिया सारणी-

	0	f_1	f_2	f_3	f_4
f_1	f_1	f_2	f_3	f_4	
f_2	f_2	f_1			
f_3	f_3		f_1		
f_4	f_4			f_1	

अवयव की कोटि =

① समूह $G_9 = \{1, \omega, \omega^2; x\}$ में अव

$$O(1) = 1, \quad O(\omega) = \omega^2$$

$$O(\omega^2) = \omega$$

$$O(i) = 4, \quad O(-i) = 2$$

$$O(-1) = 2, \quad O(1) = 1$$

$$G_4 = \{0, 1, 2, 3, 4, +_5\} \quad (\because e=0)$$

$$0(0) = 0$$

$$0(1) = 1+1+1+1+1 = (1)^5 = 0$$

$$\therefore 0(1) = 5$$

$$0(2) = 2+2+2+2+2 = (2)^5 = 0$$

$$\therefore 0(2) = 5$$

$$0(3) = 3+3+3+3+3 = (3)^5 = 0$$

$$\therefore 0(3) = 5$$

$$0(4) = 4+4+4+4+4 = (4)^5 = 0$$

$$\therefore 0(4) = 5$$

$$G_5 = \{1, 2, 3, 4, \times_5\} \quad (\because e=1)$$

$$0(1) = 1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 = (1)^5 = (1)^1 = 1$$

$$\therefore 0(1) = 1$$

$$0(2) = 2 \times 2 \times 2 \times 2 = (2)^4 = 1$$

$$\frac{2^4}{5} = 1$$

$$\therefore 0(2) = 4$$

$$0(3) = 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 3^4 = 1$$

$$\therefore 0(3) = 4$$

$$0(4) = 4 \times 4 = 4^2 \Rightarrow \frac{4^2}{5} = 1$$

$$\therefore 0(4) = 2$$

\Rightarrow अवयव a का इसके $(a-1)$ inverse की कोटि same होती है।

$$\Rightarrow \text{let } 0(a) = 1$$

$$\text{तब } a^{-1} = e \Rightarrow a = e$$

अवयव की कोटि के गुणधर्म \Rightarrow

(iii) यदि किसी ग्रुप G के एक अवयव की कोटि n है तब $a^m = e$ iff m, n का गुणधर्म है।

proof-

$$\text{let } m = kn \text{ तब}$$

$$a^m = a^{kn}$$

$$= (a^n)^k$$

$$a^m = e^k = e \quad \text{--- (1)}$$

Now let $a^n = e$
 माना $m = nq + r$
 here $0 \leq r < n$

अब $a^m = e$
 $\Rightarrow a^{nq+r} = e$
 $\Rightarrow (a^n)^q \cdot a^r = e$
 $\Rightarrow e^q \cdot a^r = e$
 $\Rightarrow e \cdot a^r = e$
 $\Rightarrow a^r = e$ (here $0 \leq r < n$)

$\therefore r = 0$ ($a^n = e$)
 $\therefore m = nq$ ($a \cdot a^{-1} = e$)
 $\Rightarrow m, n$ का गुणज है।

(V) एक group जे क किसी अवयव a क लिए
 $o(a) = o(xax^{-1}) \quad \forall x \in G$

proof.

$\therefore (xax^{-1})^2 = (xax^{-1})(xax^{-1})$
 $= xa[(x^{-1}x)a]x^{-1}$
 $= xa^2x^{-1}$

$\& (xax^{-1})^3 = (xax^{-1})^2(xax^{-1})$
 $= (xa^2x^{-1})(xax^{-1})$
 $= xa^2[(x^{-1}x)a]x^{-1}$
 $= xa^2(a)x^{-1}$
 $= xa^3x^{-1}$

Thus $(xax^{-1})^m = xa^m x^{-1} \quad ; m \in \mathbb{Z}^+$

Now let $o(a) = n$ & $o(xax^{-1}) = m$

$\therefore a^n = e$ — ①

$\therefore o(xax^{-1}) = m \Rightarrow (xax^{-1})^m = e$
 $\Rightarrow xa^m x^{-1} = e$

$\Rightarrow x^{-1}(xa^m x^{-1})x = x^{-1}(e)x$

$\Rightarrow (x^{-1}x)a^m(x^{-1}x) = e$

$\Rightarrow a^m = e \Rightarrow m, n$ का गुणज है।

$$\begin{aligned}
 \text{now } (x^{-1})^{-1} &= x \\
 &= (x^{-1})^{-1} \cdot x^{-1} \\
 &= (x^{-1})^{-1} \cdot x^{-1} \\
 &= x^{-1} \cdot x^{-1} = e \\
 \Rightarrow (x^{-1})^{-1} &= e \quad \text{--- (2)} \\
 \Rightarrow n, m \text{ का गुणज है}
 \end{aligned}$$

by 1 & 2 $\Rightarrow n = m$
 $\Rightarrow \boxed{o(a) = o(x^{-1})}$

(vi) यदि $a, b \in G$ तो $o(ab) = o(ba)$
 $\therefore o(ab) = o[(ab)^{-1}]$

$o[(ab)]$	$\Rightarrow o(eab)$
$\Rightarrow o(b^{-1}(ab)b)$	
$\Rightarrow o(ab)$	

 $= o(b^{-1}a^{-1})$
 $= o(a^{-1}b^{-1})$
 $= o((ba)^{-1})$
 $= o(ba)$

$\left\{ \because o(a) = \text{lcm}(n, p) \right\}$

(iii) यदि $o(a) = n$ हो तब $o(a^p) = \frac{n}{d}$
 here d, n & p का महत्त्व म.स.व. (HCF)
 यदि $d=1$ अर्थात् n & p सापेक्षिक अभाज्य
 हो तब $o(a) = o(a^p)$

Ex:- $G = \{1, -1, i, -i, x\}$ के लिए

$$\begin{aligned}
 o(i) &= 4 \\
 \text{Then } o(i^2) &= 4 & \left\{ \begin{aligned} i^2 &= i^3 = -i \\ o(-i) &= 4 \end{aligned} \right. \\
 o(i^{23}) &= 4 \\
 o(i^8) &= 1 \\
 o(i^{31}) &= 4
 \end{aligned}$$

(P. 30)

$$\begin{aligned}
 \therefore o(a) &= 35 \\
 \therefore o(a^{15}) &= \frac{35}{15 \text{ व } 35 \text{ का HCF}} = \frac{35}{5} \\
 &= 7
 \end{aligned}$$

Q. 1021

$$G = \{2, 4, 6, 8\}; X_{10}$$

$$2 \times_{10} 2 = 4$$

$$4 \times_{10} 6 = 4$$

$$2 \times_{10} 4 = 8$$

$$6 \times_{10} 6 = 6$$

$$2 \times_{10} 6 = 2$$

$$8 \times_{10} 6 = 8$$

$$2 \times_{10} 8 = 6$$

$\therefore 6$ तत्समक अवयव है।

$$a \times_{10} 6 = a = 6 \times_{10} a \quad \forall a \in G$$

Q. 1211

$$\therefore a, b \in G \Rightarrow ab \in G$$

$$ab = (ab)^{-1}$$

$$= b^{-1}a^{-1}$$

$$ab = ba \quad \forall a, b \in G$$

$\therefore G$ आबेली है।

But किलोम सत्य नहीं। अर्थात् कोई समूह यदि आबेली है तो जरूरी नहीं है कि G का प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिबिम्ब हो।

\Rightarrow यदि $n(A) = 5$ हो तो A पर परिभाषित द्विआधारी संक्रियाओं की सं. $\Rightarrow n(A \times A) \rightarrow A \Rightarrow 5^2$

ii) क्रमविनिमेय संक्रियाओं की सं.

$$A = \{1, -1, i, -i\}$$

X	1	-1	i	-i
1	1	-1	i	-i
-1	-1	1	-i	i
i	i	-i	1	-1
-i	-i	i	-1	1

यदि $n(A \times A) \rightarrow A$
 $\therefore n(A \times A) = 25$
 $n = 5$
 $\therefore n(A \times A) \rightarrow A$
 5^{25}

$n(A \times A) =$ जो अपेक्षा नहीं है रहे वो element $= 15$

$A \times A \rightarrow A$ की सं. $= 5^{15}$

e	e	a	b	c	d
e	ee	ea	eb	ec	ed
a	ae	aa	ab	ac	ad
b	be	ba	bb	bc	bd
c	ce	ca	cb	cc	cd
d	de	da	db	dc	dd

असमान अवयव $= 15$

१.113) समुच्चय A पर परिभाषित

$$\left(\begin{array}{l} \text{अक्रमविनिमय} \\ \text{वि. संक्रिया की सं.} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{l} \text{A पर परिभाषित} \\ \text{कुल संक्रियाओं} \\ \text{की सं.} \end{array} \right) - \left(\begin{array}{l} \text{क्रमविनिमय} \\ \text{विभाज्य सं.} \end{array} \right)$$

$$= 5^{25} - 5^{15} = 5^{15}(5^{10} - 1)$$

परिणाम \Rightarrow यदि $n(a) = m$ हो तब

- (i) समुच्चय A पर परिभाषित विभाज्य संक्रियाओं की सं. $= m^{m^2}$
- (ii) समुच्चय A पर परिभाषित अक्रमविनिमय संक्रियाओं की सं. $= m \frac{m(m+1)}{2}$
- (iii) समुच्चय A पर " " अक्रमविनिमय " " सं. $= m^{m^2} - m \frac{m(m+1)}{2}$

सं.

यदि $n=5$ हो तो अक्रमविनिमय संख्याओं की सं. $= 5^{25} - 5^{15}$

यदि $n=4$ हो तो अक्रमविनिमय संख्याओं की सं. $\Rightarrow 4^{16} - 4^{10}$

$$o(e) = 1$$

$$o(a) \leq o(b)$$

$$o(a) = o(a^{-1})$$

$$o(ab) = o(ba)$$

यदि $o(a) = n$ हो तब $o(a^p) = \frac{n}{d}$; here d, n का HCF (म.स.प.) हैं।

जब $p \times n$ सापेक्षिक अभाज्य हैं तब $d=1$

\Rightarrow यदि G आवर्ती हो-

$$o(ab) = o(a) \vee o(b) \text{ का LCM}$$

Result

page - 7

③ $(ab)^2 = a^2 b^2 \Leftrightarrow G$ आवर्ती है।

$$(ob) \cdot (ab) = oa \cdot bb$$

$$a(ba)b = a(ab)b$$

$$ba = ab$$

विलोमतः

$$ab = ba$$

$$(ab)(ab) = (ba)(ab)$$

$$a(bab) = b(aab)$$

$$= b(a^2b)$$

$$= (bb)a^2$$

$$(ab)^2 = a^2b^2$$

④ $G = \langle e, a, b, c \rangle$ एक ग्रुप है।

here $e^{-1} = e$

या तो $a^{-1} = a$, $b^{-1} = b$ या $c^{-1} = c$

या $a^{-1} = b$ हो तब $ab = ba = e$

$$[c^{-1} = c]$$

⑤ $\therefore a, b$ कम्यूनिमस हैं।

$$ab = ba$$

$$(ab)^{-1} = (ba)^{-1}$$

$$(b^{-1}a^{-1}) = (a^{-1}b^{-1})$$

$\Rightarrow \therefore a^{-1}b^{-1}$ भी कम्यूनिमस है।

Again

$$ab = ba$$

$$a^{-1}(ab) = a^{-1}(ba)$$

$$(a^{-1}a)b = (a^{-1}b)a$$

$$\Rightarrow eb = a^{-1}(ba)$$

$$\Rightarrow b = a^{-1}(ba)$$

$$\Rightarrow ba^{-1} = (a^{-1}b)(aa^{-1})$$

$$\Rightarrow ba^{-1} = a^{-1}b$$

$\therefore ba^{-1}$ या $a^{-1}b$ भी कम्यूनिमस है।

Similarly

⑥

G आवेनी then $(ab)^n = a^n b^n$

Case - I

$n=0$ हो तब

$$(ab)^0 = e$$

$$= e \cdot e$$

$$\Rightarrow (ab)^0 = a^0 b^0$$

सतः $n=0$ के लिए सत्य है।