



# CG-TET

UPPER Primary Class (VI-VIII)

राज्य शैक्षिक अनुसन्धान और परीक्षा परिषद्, छत्तीसगढ़

भाग – 4

गणित



# CONTENTS


## गणित

1.	संख्या पद्धति	1
2.	लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्तक	17
3.	वर्ग और वर्गमूल	26
4.	घन और घनमूल	30
5.	बीजगणितीय सर्वसमिकाएँ	33
6.	लाभ-हानि	45
7.	बट्टा	59
8.	प्रतिशतता	68
9.	अनुपात तथा समानुपात	78
10.	भिन्न	90
11.	आयु	97
12.	साधारण ब्याज	101
13.	चक्रवृद्धि ब्याज	112
14.	सांख्यिकी (आँकड़ों का प्रबन्धन )	123
15.	ज्यामिति	131
16.	क्षेत्रमिति	158
17.	प्रायिकता	200
18.	गणित की प्रकृति एवं तर्कशक्ति	214
19.	गणित की महत्ता	217

20.	गणित की भाषा एवं सामुदायिक गणित	219
21.	गणित की शिक्षण विधियाँ एवं सहायक सामग्री	221
22.	शिक्षण की समस्याएँ	229
23.	गणित में मूल्यांकन	230
24.	निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण	233

# संख्या पद्धति

## (Number System)



सम्मिश्र संख्याएँ (Complex Number) (z)

$Z =$  वास्तविक संख्या + काल्पनिक संख्या

$$Z = a + ib$$

जहाँ a = वास्तविक संख्या

b = काल्पनिक संख्या

## वास्तविक संख्याएँ

परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं। इन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है।

काल्पनिक संख्याएँ : जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है।

पूर्णांक संख्याएँ : संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिसमें पूर्ण संख्याओं के साथ-साथ ऋणात्मक संख्याएँ भी सम्मिलित हो, पूर्णांक संख्याएँ कहलाती हैं, इसे  $\mathbb{Z}$  से सूचित करते हैं।  
 $\mathbb{Z} = \{-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$

प्राकृत संख्याएँ : जिन संख्याओं का इस्तेमाल वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है, प्राकृत संख्या कहते हैं।  
 $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$

पूर्ण संख्याएँ : जब प्राकृत संख्याओं के परिवार में 0 को भी शामिल कर लेते हैं, तब वह पूर्ण संख्याएँ कहलाती हैं।  
 $\mathbb{W} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$   
 चार लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा 24 से पूर्णतः विभाज्य होता है।

सम संख्याएँ : संख्याएँ जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो सम संख्या कहलाती हैं।

$$n \text{ वां पद} = 2n$$

$$\text{प्रथम } n \text{ सम संख्याओं का योग} = n(n+1)$$

$$\text{प्रथम } n \text{ सम संख्याओं के वर्गों का योग} = \frac{2n(n+1)(2n+1)}{3}$$

$$\left\{ n = \frac{\text{अंतिम पद}}{2} \right\}$$

विषम संख्याएँ : वह संख्याएँ जो 2 से विभाजित न हो, विषम संख्याएँ होती हैं।

$$\text{प्रथम } n \text{ विषम संख्याओं का योग} = n^2$$

$$\left\{ n = \frac{\text{अंतिम पद} + 1}{2} \right\}$$

प्राकृतिक संख्याएँ : प्रथम  $n$  प्राकृतिक संख्याओं का योग  $= \frac{n(n+1)}{2}$

$$\text{प्रथम } n \text{ प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\text{प्रथम } n \text{ प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग} = \left[ \frac{n(n+1)}{2} \right]^2$$

दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर उनके योगफल के बराबर होता है।

उदाहरण -  $11^2 = 121$

$12^2 = 144$

$11 + 12 \rightarrow 23$  Difference  $144 - 121 = 23$

**अभाज्य संख्याएँ (Prime Numbers)** - जिन्हें सिर्फ दो form हो-  $1 \times$  संख्या

जैसे -  $\{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, \dots\}$

जहाँ 1 Prime Number नहीं है।

2 एकमात्र शम Prime संख्या है।

3, 5, 7 क्रमागत विषम अभाज्य संख्या का इकलौता जोड़ा है।

1 से 25 तक कुल अभाज्य संख्या = 9

25 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या = 6

1-50 तक कुल 15 Prime Number है।

51-100 तक कुल 10 Prime Number है।

अतः 1-100 तक कुल 25 Prime Number है।

1 से 200 तक कुल अभाज्य संख्या = 46

1 से 300 तक कुल अभाज्य संख्या = 62

1 से 400 तक कुल अभाज्य संख्या = 78

1 से 500 तक कुल अभाज्य संख्या = 95

**सह अभाज्य संख्याएँ** - वह संख्याएँ जिनका HCF सिर्फ 1 हो।

उदाहरण -  $(4, 9), (15, 22), (39, 40)$

HCF = 1

**Perfect Number (परफेक्ट संख्या)** - वह संख्या जिन्हें गुणनखण्डों का योग उस संख्या के बराबर हो (गुणनखण्डों में स्वयं उस संख्या को छोड़कर)

उदाहरण -  $6 \rightarrow 1, 2, 3 \rightarrow$  यहाँ  $1+2+3 \rightarrow 6$

$28 \rightarrow 1, 2, 4, 7, 14 \rightarrow 1+2+4+7+14 \rightarrow 28$

**परिमेय (Rational) संख्याएँ** - वह संख्याएँ जिन्हें  $P/Q$  form में लिखा जा सकता है, लेकिन Q जहाँ शून्य नहीं होना चाहिए, P व Q पूर्णांक होने चाहिए।

उदाहरण -  $2/3, 4/5, \frac{10}{-11}, \frac{7}{8}$

**अपरिमेय (Irrational) संख्याएँ** - इन्हें  $P/Q$  form में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता।

उदाहरण -  $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{11}, \sqrt{19}, \sqrt{26} \dots$

**पूर्णवर्ग संख्या**



Unit Digit जो वर्ग के हो सकते हैं

- 0
- 1
- 4
- 5 or 25
- 6
- 9

जो नहीं हो सकते

- 2 —
- 3 —
- 7 —
- 8 —

- किसी भी संख्या के वर्ग के अंतिम दो अंक वही होंगे जो 1-24 तक की संख्याओं के वर्ग के अंतिम दो अंक होंगे।

**नोट** - अतः सभी को 1-25 के वर्ग अवश्य याद होने चाहिए।

## Binary व Decimal में बदलना

### 1. Decimal संख्या को Binary में बदलना

किसी दशमलव संख्या के समतुल्य Binary number ज्ञात करने के लिए हम प्रदत्त दशमलव संख्या को लगातार 2 से तब तक भाग देते हैं जब तक कि अंतिम भागफल के रूप में 1 प्राप्त नहीं होता है।

उदाहरण -

2	89	$2 \times 44 = 88 ; 89 - 88 = 1$
	44	$2 \times 22 = 44 ; 44 - 44 = 0$
	22	$2 \times 11 = 22 ; 22 - 22 = 0$
	11	$2 \times 5 = 10 ; 11 - 10 = 1$
	5	$2 \times 2 = 4 ; 5 - 4 = 1$
	2	$2 \times 1 = 2 ; 2 - 2 = 0$
	1	अंतिम भागफल

अतः 89 के समतुल्य Binary number =  $(1011001)_2$

### 2. Binary को Decimal में बदलना

Binary system में 1 का मान जब वह हर बार अपनी बाईं ओर एक स्थान खिसकता है, स्वयं का दोगुना हो जाता है तथा जहाँ कहीं भी 0 आता है उसका मान 0 होता है।

उदाहरण -

1	0	1	1	0	0	1
$2^6$	$2^5$	$2^4$	$2^3$	$2^2$	$2^1$	$2^0$

Now

$$\begin{aligned}
 (1011001)_2 &= 1 \times 2^6 + 0 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 \\
 &= 64 + 0 + 16 + 8 + 8 + 0 + 1 \{2^0 = 1\} \\
 &= 89
 \end{aligned}$$

### भाजकों की संख्या या गुणनसंख्या की संख्या निकालना

पहले संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसे Power के रूप में लिखेंगे तथा प्रत्येक (Power) घात में एक जोड़कर गुणा करेंगे तो भाजकों की संख्या प्राप्त हो जायेगी।

उदाहरण - 2280 को कुल कितनी संख्याओं से पूर्णतः भाग दिया जा सकता है।

हल -  $2280 = 2^3 \times 3^1 \times 5^1 \times 19^1$   
 भाजकों की संख्या =  $(3+1)(1+1)(1+1)(1+1)$   
 $= 4 \times 2 \times 2 \times 2 = 32$

## इकाई का शंक ज्ञात करना

1. जब शंख्या घात (power) के रूप में हो

जब Base का इकाई शंक 0, 1, 5 या 6 हो, तो कोई भी प्राकृतिक घात के लिए परिणाम का इकाई शंक वही रहेगा।

जब base का इकाई शंक 2, 3, 4, 7, 8, या 9 हो, तो Power में 4 से भाग देंगे और जितना शेष प्राप्त होगा उतना ही Base के इकाई शंक पर power रखेंगे। जब power, 4 से पूर्णतः कर जाता है तो base के इकाई शंक पर 4 power रखेंगे।

2. शरलीकरण के रूप में हो

प्रत्येक शंख्या के इकाई के शंक को लिखकर चिन्ह के अनुसार शरल करेंगे जो परिणाम आयेगा उसका इकाई शंक उतर होगा।

## Power वाली शंख्याओं में भाग देना (भाजक निकालना)

1. यदि  $a^n + b^n$  दिया हो तो

$n$  विषम होने पर  $(a+b)$  इसका भाजक होगा।

2. यदि  $a^n - b^n$  दिया हो तो।

$n$  विषम होने पर भाजक  $\rightarrow (a-b)$

$n$  सम होने पर भाजक  $\rightarrow (a-b)$  या  $(a+b)$  या दोनों।

1.  $a^n \div (a-1)$  हो, तो शेषफल हमेशा 1 बचेगा।

2.  $a^n \div (a+1)$   $\left\{ \begin{array}{l} \text{यदि } n \text{ सम हो, तो हमेशा } 1 \text{ बचेगा।} \\ \text{यदि } n \text{ विषम हो, तो शेषफल } a \text{ होगा} \end{array} \right.$

3.  $(a^n + a) \div (a-1)$  हो, तो शेषफल 2 बचेगा

4.  $(a^n + a) \div (a+1)$   $\left\{ \begin{array}{l} \text{यदि } n \text{ सम हो, तो शेषफल शून्य (0) होगा।} \\ \text{यदि } n \text{ विषम हो, तो शेषफल } (a-1) \text{ होगा।} \end{array} \right.$

## शांत दशमलव

वह शंख्याएँ जो दशमलव के बाद कुछ शंकों के बाद खत्म हो जाये जैसे - 0.25, 0.15, 0.375 इसे भिन्न शंख्या में लिखा जा सकता है।



### अशांत दशमलव

वह संख्याएँ जो दशमलव के बाद चलते रहते हैं और ये दो तरह के हो सकते हैं ।

0.3333, 0.7777, 0.183183183.....

पुनरावृत्ति  
Repeating

जो संख्याएँ दशमलव के बाद कभी खत्म नहीं होती बल्कि पुनरावृत्ति करती हो, अनंत तक । इसे भिन्न में लिखा जा सकता है ।

Non  
Repeating  
Decimal

जो संख्याएँ दशमलव के बाद कभी खत्म नहीं होती पर ये अपनी संख्याओं की निश्चित पुनरावृत्ति (Repeat) नहीं करती ।

### आवर्ती दशमलव भिन्न

वह दशमलव भिन्न दशमलव बिंदु के बाद एक या अधिक अंकों की पुनरावृत्ति होती है तो बिंदु के बाद एक या अधिक अंकों की पुनरावृत्ति होती है ।

जैसे -  $\frac{1}{3} = 0.333\dots$ ,  $\frac{22}{7} = 3.14285714\dots$  ऐसी भिन्नों को व्यक्त करने के लिए दोहराए जाने वाले अंक के ऊपर एक रेखा खींच देते हैं ।

$$0.333\dots = 0.\overline{3}$$

$$\frac{22}{7} = 3.14285714\dots = 3.\overline{142857}$$

इसे बार बोलते हैं ।

- शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न को निम्न प्रकार से साधारण भिन्न में बदले -

$$0.\overline{p} = \frac{p}{9}$$

$$0.\overline{pq} = \frac{pq}{99}$$

$$0.\overline{pqr} = \frac{pqr}{999}$$

- मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न को निम्न प्रकार से साधारण भिन्न में बदले -

$$0.p\overline{q} = \frac{pq-p}{90}$$

$$0.pq\overline{r} = \frac{pqr-pq}{900}$$

$$0.p\overline{qrs} = \frac{pqr-p}{990}$$

$$0.pq\overline{rs} = \frac{pqrs-pq}{9900}$$

उदाहरण - (i)  $0.\overline{39} = \frac{39}{99} = \frac{13}{33}$

(ii)  $0.6\overline{25} = \frac{625-6}{990} = \frac{619}{990}$

(iii)  $0.35\overline{24} = \frac{3524-35}{9900} = \frac{3489}{9900} = \frac{1163}{3300}$

## रोमन पद्धति के संकेतक

1	→	I
2	→	II
3	→	III
4	→	IV
5	→	V
6	→	VI
7	→	VII
8	→	VIII
9	→	IX
10	→	X
20	→	XX
30	→	XXX
40	→	XL
50	→	L
100	→	C
500	→	D
1000	→	M

## विभाजकता के नियम

2 से	अन्तिम अंक 2म संख्या या शून्य (0) हो जैसे - 236, 150, 1000004
3 से	किसी संख्या में अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तो पूर्ण संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे - 729, 12342, 5631
4 से	अन्तिम दो अंक शून्य हो या 4 से विभाजित हो जैसे - 1024, 58764, 567800
5 से	अन्तिम अंक शून्य या 5 हो जैसे - 3125, 625, 1250
6 से	कोई संख्या अगर 2 तथा 3 दोनों से विभाजित हो तो वह 6 से भी विभाजित होगी। जैसे - 3060, 42462, 10242
7 से	किसी संख्या के अन्तिम अंक को 2 से गुणा करके शेष संख्या से घटाने पर यदि संख्या 0 या 7 का गुणज हो तो अथवा किसी भी अंक का 6 के गुणज में दोहराए तो संख्या 7 से विभाज्य होगी। जैसे - 222222, 444444444444, 7854
8 से	यदि किसी संख्या के अन्तिम तीन अंक 8 से विभाज्य हो या अन्तिम तीन अंक '000' (शून्य) हो। जैसे - 9872, 347000
9 से	किसी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य हो तो पूर्ण संख्या 9 से विभाज्य होगी।
10 से	अन्तिम अंक शून्य (0) हो तो
11 से	विषम स्थानों पर अंकों का योग व 2म स्थानों पर अंकों के योग का अन्तर शून्य (0) या 11 या 11 का गुणज हो तो

	जैसे - 1331, 5643, 8172659
12 से	3 व 4 के विभाज्य का संयुक्त रूप
13 से	अंक का 6 बार दोहराए तो, या अंतिम अंक का 4 से गुणा करके शेष संख्या में जोड़ने पर संख्या अगर 13 से विभाजित हो तो पूर्ण संख्या 13 से विभाजित होगी। जैसे - 222222, 17784

## हल सहित उदाहरण

### संख्याओं के योग, अंतर तथा गुणनफल पर आधारित

उदा.1 यदि किसी संख्या का  $\frac{3}{4}$  उस संख्या के  $\frac{1}{6}$  से 7 अधिक है, तो उस संख्या  $\frac{5}{3}$  क्या होगा ?

- (a) 12                                      (b) 18                                      (c) 15                                      (d) 20

उत्तर (d)

हल माना कि संख्या = x

प्रश्नानुसार,

$$\Rightarrow \frac{9x - 2x}{12} = 7$$

$$\Rightarrow 7x = 7 \times 12$$

$$\Rightarrow x = 12$$

$\Rightarrow$  संख्या का  $\frac{5}{3}$  भाग

$$= \frac{x - 5}{3} \Rightarrow \frac{12 \times 5}{3} = 20$$

उदा.2 यदि दो संख्याओं का योगफल तथा उनका गुणनफल a तथा b, उनके व्युत्क्रमों का योगफल होगा

- (a)  $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$                                       (b)  $\frac{b}{a}$                                       (c)  $\frac{a}{b}$                                       (d)  $\frac{a}{ab}$

उत्तर (c)

हल माना दो संख्याएँ P तथा Q हैं।

$$P + Q = a$$

$$PQ = b$$

$$\frac{1}{P} + \frac{1}{Q} \Rightarrow \frac{Q + P}{PQ} = \frac{a}{b}$$

उदा.3 दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है, तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा ?

- (a) 1350                                      (b) 1250  
(c) 1000                                      (d) 125

उत्तर (b)

हल माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y हैं।

$\therefore x + y = 75$  ..... (i)

तथा  $x - y = 25$  ..... (ii)

$2x = 100$  (समी. (i) एवं समी. (ii)) को जोड़ने पर

$x = 50$

$x$  का मान समी. (i) में रखने पर

$50 + y = 75$

$y = 75 - 50 = 25$

अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल =  $xy$

$= 50 \times 25 \Rightarrow 1250$

उदा.4 एक विद्यार्थी ने किसी संख्या का  $\frac{5}{16}$  ज्ञात करने के लिये कहा गया और गलती से उस संख्या का  $\frac{5}{6}$  ज्ञात कर लिया अर्थात् उसका उत्तर सही उत्तर से 250 अधिक था तो दी हुई संख्या ज्ञात कीजिये ।

- (a) 300                      (b) 480                      (c) 450                      (d) 500

उत्तर (b)

हल मान लीजिए कि संख्या  $X$  है

प्रश्न के अनुसार

$\frac{5}{6}x - \frac{5}{16}x = 250$

$\frac{40x - 15x}{48} = 250$

$25x = 250 \times 48$

$x = \frac{250 \times 48}{25} = 480$  उत्तर

**सम, विषम तथा अभाज्य संख्याओं पर आधारित**

उदा.1 यदि किन्हीं तीन क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 147 हो, तो बीच वाली संख्या होगी ।

- (a) 47                      (b) 48                      (c) 49                      (d) 51

उत्तर (c)

हल  $x =$  कोई विषम संख्या है ।

प्रश्नानुसार,

$(x) + (x + 2) + (x + 4) = 147$

$3x + 6 = 147$

$x = \frac{141}{3} = 47$

Middle Number  $(x + 2) = 47 + 2 = 49$

उदा.2 तीन ऋभाज्य संख्याओं का योग 100 है यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक हो तो एक संख्या क्या होगा ?

हल  $x + y + z = 100$

$\{x = 2 \text{ ऋवश्य होगा}\}$

$2 + y + z = 100 \quad y + z = 100 - 2 = 98$

$y - z = 36 \quad 2y = 134$

$y = 1 \quad x = 2$

$z = 98 - 67 = 31 \text{ उत्तर}$

**भाग, भागफल तथा शेषफल पर ऋाधारित**

उदा.1 64329 को जब किली संख्या से भाग दिया जाता है, तो 175, 114 तथा 213 लगातार तीन शेषफल ऋते हैं तो भाज्य क्या है ?

- (a) 184                      (b) 224                      (c) 234                      (d) 296

उत्तर (c)

हल

$$\begin{array}{r}
 \text{xxx} \overline{)64329} \text{ xxx} \\
 \underline{\text{xxx}} \quad \text{(i)} \\
 1752 \\
 \underline{\text{xxx}} \quad \text{(ii)} \\
 1149 \\
 \underline{\text{xxx}} \quad \text{(iii)} \\
 213
 \end{array}$$

Number at (1) =  $643 - 175 = 468$

Number at (2) =  $1752 - 114 = 1638$

Number at (3) =  $1149 - 213 = 936$

H.C.F. of 468, 1638, 936 = 234

The divisor is 234. उत्तर

उदा.2  $(3^{25} + 3^{26} + 3^{27} + 3^{28})$  विभाजित है ।

- (a) 11                      (b) 16                      (c) 25                      (d) 30

उत्तर (d)

हल  $(3^{25} + 3^{26} + 3^{27} + 3^{28})$

$3^{25} (3^0 + 3^1 + 3^2 + 3^3)$

$3^{25} \times 40 = 3^{24} \times 120$

(ऋब विकल्प चेक करें इले केवल 30 ही विभाजित कर सकता है)

उदा.3 विभाजन के एक योगफल में विभाजक, भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है । तदनुसार, यदि 32में शेषफल 36 हो, तो भाज्य कितना होगा ?

- (a) 2706 (b) 2796  
(c) 2736 (d) 2826

उत्तर (c)

हल शेषफल = 36

$$\therefore \text{विभाजक} = 5 \times 36 = 180$$

$$\therefore \text{भागफल} = \frac{180}{12} = 15$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{भाज्य} &= \text{विभाजक} \times \text{भागफल} + \text{शेषफल} \\ &= 180 \times 15 + 36 \\ &= 2700 + 36 \\ &= 2736 \text{ उत्तर} \end{aligned}$$

### इकाई शंक निकालना आधारित

उदा.1  $416 \times 333 + 2167 \times 118 - 114 \times 133$  के परिणाम का इकाई शंक ज्ञात कीजिए ?

हल  $6 \times 3 + 7 \times 8 - 4 \times 3$   
 $18 + 56 - 12 = 62$   
 $= 2$  उत्तर

उदा.2  $(3694)^{1739} \times (615)^{317} \times (841)^{491}$  में इकाई शंक कितना है ?

- (a) 0 (b) 2  
(c) 3 (d) 5

हल  $(3694)^{1739}$  में इकाई शंक =  $(4)^{1739}$  में इकाई शंक =  $\{(4^2)^{896} \times 4\}$  में इकाई शंक  
 $= (6 \times 4)$  में इकाई शंक = 4  
 $(615)^{317}$  में इकाई शंक =  $(5)^{317}$  में इकाई शंक = 5  
 $(841)^{491}$  में इकाई शंक =  $(1)^{491}$  में इकाई शंक = 1  
 $5 \times 4 \times 1 = 20$  इकाई शंक = 0

### प्राकृतिक संख्याओं के square एवं cube तथा उनके योग एवं अंतर आधारित

उदा.1  $(11^2 + 12^2 + 13^2 + \dots + 20^2) = ?$

- (a) 385 (b) 2485  
(c) 2870 (d) 3255

हल हम जानते हैं कि :  $(1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2) = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$

$$\begin{aligned} \therefore \text{दिया गया व्यंजक} &= (1^2 + 2^2 + \dots + 10^2 + 11^2 + \dots + 20^2) - (1^2 + 2^2 + \dots + 10^2) \\ &= \left(\frac{1}{6} \times 20 \times 21 \times 41\right) - \left(\frac{1}{6} \times 10 \times 11 \times 21\right) = (2870 - 385) = 2485. \end{aligned}$$

उदा.2  $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + 10^3 = ?$

हल  $n = 10$

$$\therefore \sum N^3 = \left\{ \frac{N(N+1)}{2} \right\}^2$$

$$\begin{aligned} \therefore ? &= \left\{ \frac{10(10+1)}{2} \right\}^2 = \left( \frac{11 \times 10}{2} \right)^2 \\ &= 55^2 = 3025 \end{aligned}$$

### दशमलव संख्या का आधारित

उदा.1 एक विद्यार्थी को निम्नलिखित व्यंजक को सरल करने को कहा गया

$$\frac{0.0016 \times 0.025}{0.325 \times 0.05} \div \frac{0.1216 \times 0.105 \times 0.002}{0.08512 \times 0.625 \times 0.039} + \left( \sqrt[6]{27} - \sqrt{6\frac{3}{4}} \right)^2$$

उसका उत्तर  $\frac{19}{10}$  था। उसके उत्तर में कितने प्रतिशत त्रुटि थी ?

हल दिया गया व्यंजक  $= \frac{16 \times 25}{325 \times 5 \times 100} \div \frac{1216 \times 105 \times 2 \times 10}{8512 \times 625 \times 39} + \left\{ (3^3)^{\frac{1}{6}} - \sqrt{\frac{27}{4}} \right\}^2$

$$= \frac{4}{1625} \div \frac{4}{325} + \left\{ 3^{\left(\frac{3 \times 1}{6}\right)} - \sqrt{\frac{27}{4}} \right\}^2 = \frac{4}{1625} \times \frac{325}{4} + \left( \sqrt{3} - \frac{3\sqrt{2}}{2} \right)^2$$

$$= \frac{1}{5} + \left( 3 + \frac{27}{4} - 9 \right) = \left( \frac{1}{5} + \frac{3}{4} \right) = \frac{19}{20}$$

सही उत्तर  $= \frac{19}{20}$ , विद्यार्थी का उत्तर  $= \frac{19}{10}$

$$\text{त्रुटि} \left( \frac{19}{20} - \frac{19}{10} \right) = \frac{1}{20}$$

$$\text{त्रुटि \%} = \frac{(1/20)}{(19/20)} \times 100 = \left( \frac{1}{20} \times \frac{20}{19} \times 100 \right) = \frac{100}{19} \% = 5\frac{5}{19} \%$$

उदा.2  $\frac{0.\overline{936} - 0.\overline{568}}{0.45 + 2.67}$  को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए ?

हल  $0.\overline{936} = \frac{936}{999}, 0.\overline{568} = \frac{568}{999}$

$$\therefore (0.\overline{936} - 0.\overline{568}) = \left( \frac{936}{999} - \frac{568}{999} \right) = \frac{(936 - 568)}{999} = \frac{368}{999}$$

$$0.\overline{45} = \frac{45}{99}, 2.\overline{67} = 2 + 0.\overline{67} = 2 + \frac{67}{99} = \frac{198 + 67}{99} = \frac{265}{99}$$

$$\therefore (0.\overline{45} + 2.\overline{67}) = \left( \frac{45}{99} + \frac{265}{99} \right) = \frac{(45 + 265)}{99} = \frac{310}{99}$$

$$\text{दिया गया व्यंजक} = \left( \frac{\overset{184}{\cancel{368}}}{\underset{111}{\cancel{999}}} \times \frac{\overset{11}{\cancel{99}}}{\underset{155}{\cancel{310}}} \right) = \frac{2024}{17205}$$

### शून्य की संख्या पर आधारित

**उदा.1**  $(1^1 \times 2^2 \times 3^3 \times 4^4 \times \dots \times 98^{98} \times 99^{99} \times 100^{100})$  के गुणफल में जीरो (शून्यों) की संख्या ज्ञात करें ?

- |          |          |
|----------|----------|
| (a) 1200 | (b) 1300 |
| (c) 1500 | (d) 1600 |

**हल** (b)

शून्यों की संख्या 5 की संख्या तथा 2 की संख्या पर निर्भर करता है।

$$\begin{aligned}
 &5 \text{ की संख्या} = (5+10+15+\dots+100) + (25+50+75+100) \\
 &= 5(1+2+\dots+20) + 250 \\
 &= 5 \times \frac{20 \times 21}{2} + 250 \\
 &= 1050 + 250 = 1300
 \end{aligned}$$

**उदा.2**  $1 \times 2 \times 3 \times \dots \times 250$  को गुणा किया जाए तो परिणाम के अंत में कितने 0 होंगे ?

**हल**  $\frac{250}{5} = 50$

$$\frac{50}{5} = 10$$

$$\frac{10}{5} = 2$$

$$\therefore \text{शून्यों की संख्या} = 50 + 10 + 2 = 62$$

### सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या/भिन्न ज्ञात करना आधारित

**उदा.1** निम्न में से  $\frac{2}{5}$  और  $\frac{4}{9}$  के बीच उपस्थित भिन्न हैं ?

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| (a) $\frac{3}{7}$ | (b) $\frac{2}{3}$ |
| (c) $\frac{4}{5}$ | (d) $\frac{1}{2}$ |

**हल** (a)



$$\frac{2}{5} = 0.40 \qquad \frac{4}{9} = 0.44$$

$$\frac{3}{7} = 0.43 \quad \frac{2}{3} = 0.66$$

$$\frac{4}{5} = 0.80 \qquad \frac{1}{2} = 0.50$$

स्पष्टतः निम्न  $\frac{3}{7}, \frac{2}{5}$  तथा  $\frac{4}{9}$  के बीच उपस्थित है।

उदा.2 निम्न में से बड़ी संख्या है।  $(3)^{\frac{1}{3}}, (2)^{\frac{1}{2}}, 1, (6)^{\frac{1}{6}}$

(a)  $(2)^{\frac{1}{2}}$  (b) 1

(c)  $(6)^{\frac{1}{6}}$  (d)  $(3)^{\frac{1}{3}}$

हल (d)

(घातों का ल.स.प. लेने पर)  $(3, 2, 1 \text{ और } 6) = 12$

$$(3)^{\frac{1}{3}} \Rightarrow (3^4)^{\frac{1}{12}} = 81^{\frac{1}{12}}$$

$$(2)^{\frac{1}{2}} \Rightarrow (2^6)^{\frac{1}{12}} = 64^{\frac{1}{12}}$$

$$(1) \Rightarrow (1^{12})^{\frac{1}{12}} = 1^{\frac{1}{12}}$$

$$(6)^{\frac{1}{6}} \Rightarrow (6^2)^{\frac{1}{12}} = 36^{\frac{1}{12}}$$

अतः बड़ी संख्या =  $(3)^{\frac{1}{3}}$  है।

### आरोही/अवरोही क्रम आधारित

उदा.1  $\sqrt{2}, \sqrt[3]{4}, \sqrt[4]{6}$  को बढ़ते क्रम में लिखने पर -

(a)  $\sqrt{2}, \sqrt[3]{4}, \sqrt[4]{6}$  (b)  $\sqrt[4]{6} < \sqrt{2} < \sqrt[3]{4}$

(c)  $\sqrt[4]{6} < \sqrt[3]{4} < \sqrt{2}$  (d)  $\sqrt{2} < \sqrt[4]{6} < \sqrt[3]{4}$

हल 2, 3, 4 का ल. स. = 12

$$\sqrt{2} = \left(2^2\right)^{\frac{1}{12}} = (2^6)^{\frac{1}{12}} = (64)^{\frac{1}{12}}$$

$$\sqrt[4]{6} = 6^{\frac{1}{4}} = (6^3)^{\frac{1}{12}} = (216)^{\frac{1}{12}}$$

स्पष्ट है कि  $(64)^{\frac{1}{12}} < (216)^{\frac{1}{12}} < (256)^{\frac{1}{12}}$

अर्थात्  $\sqrt{2} < \sqrt[4]{6} < \sqrt[3]{4}$

उदा.2 निम्नलिखित को आरोही क्रम में रखाएँ -

$$\sqrt{7} - \sqrt{5}, \sqrt{5} - \sqrt{3}, \sqrt{9} - \sqrt{7}, \sqrt{11} - \sqrt{9}$$

हल  $\sqrt{7} - \sqrt{5} = \frac{(\sqrt{7} - \sqrt{5}) \times (\sqrt{7} + \sqrt{5})}{\sqrt{7} + \sqrt{5}} = \frac{7 - 5}{\sqrt{7} + \sqrt{5}} = \frac{2}{\sqrt{7} + \sqrt{5}}$

$$\sqrt{5} - \sqrt{3} = \frac{(\sqrt{5} - \sqrt{3}) \times (\sqrt{5} + \sqrt{3})}{\sqrt{5} + \sqrt{3}} = \frac{5 - 3}{\sqrt{5} + \sqrt{3}} = \frac{2}{\sqrt{5} + \sqrt{3}}$$

इसी तरह,  $\sqrt{9} - \sqrt{7} = \frac{2}{\sqrt{9} + \sqrt{7}}$  एवं  $\sqrt{11} - \sqrt{9} = \frac{2}{\sqrt{11} + \sqrt{9}}$

हम जानते हैं कि हर में वृद्धि के साथ-साथ भिन्न का मान कम होता जाता है। इसलिए,

$$\frac{2}{\sqrt{11} + \sqrt{9}} < \frac{2}{\sqrt{9} + \sqrt{7}} < \frac{2}{\sqrt{7} + \sqrt{5}} < \frac{2}{\sqrt{5} + \sqrt{3}}$$

या  $\sqrt{11} - \sqrt{9} < \sqrt{9} - \sqrt{7} < \sqrt{7} - \sqrt{5} < \sqrt{5} - \sqrt{3}$

नोट - उपर्युक्त उदाहरण से एक महत्वपूर्ण परिणाम की प्राप्ति हुई। इसे याद रखना चाहिए।

उदा.3 संख्याओं  $\frac{7}{9}, \frac{11}{13}, \frac{16}{19}, \frac{21}{25}$  को आरोही क्रम में लिखिये ?

हल प्रत्येक दी गई संख्या को दशमलव भिन्न में व्यक्त करने पर -

$$\frac{7}{9} = 0.777, \frac{11}{13} = 0.846, \frac{16}{19} = 0.842 \text{ तथा } \frac{21}{25} = 0.840.$$

अरोही क्रम में लेने पर :

$$0.846 > 0.842 > 0.840 > 0.777$$

अतः  $\frac{11}{13} > \frac{16}{19} > \frac{21}{25} > \frac{7}{9}$

### गुणनखंडों की संख्या पर आधारित

उदा.1  $\{(127)^{127} + (97)^{127}\}$  तथा  $\{(127)^{97} + (97)^{97}\}$  का अभ्यनिष्ठ गुणनखण्ड क्या होगा ?

(a) 127

(b) 97

(c) 30

(d) 224

हल  $(x^m + y^m)$  का एक गुणनखण्ड  $(x + y)$  है यदि  $m$  विषम हो।

$\therefore \{(127)^{127} + (97)^{127}\}$  का एक गुणनखण्ड  $(127 + 97) = 224$  है।

इसी प्रकार,  $\{(127)^{97} + (97)^{97}\}$  का एक गुणनखण्ड  $(127 + 97) = 224$  है।

अतः दोनों का अभ्यनिष्ठ गुणखण्ड 224 है ।

उदा.2  $\frac{(18)^{15} \times (75)^{16} \times (42)^{14}}{(35)^{12} \times (12)^{16}}$  में कितने अभाज्य खंड हैं ?

हल  $(18)^{15}$  में अभाज्य खंड =  $3 \times 15 = 45$

$(75)^{16}$  में अभाज्य खंड =  $3 \times 16 = 48$

$(42)^{14}$  में अभाज्य खंड =  $3 \times 14 = 42$

$(35)^{12}$  में अभाज्य खंड =  $2 \times 12 = 24$

$(12)^{16}$  में अभाज्य खंड =  $3 \times 16 = 48$

अभाज्य खंडों की संख्या =  $(45 + 48 + 42) - (24 + 48)$

$= 135 - 72 = 63$

